

55, rue Mazenod - 69426 LYON CÉDEX 03 - ☎ 78.95.48.48

9 Juillet 1987

N° de série continue 154

Bulletin n° 20

PLUIE OU IRRIGATION SUR FRONDAISON : PENSEZ AU LESSIVAGE
ARBRES RECOLTES ET JEUNES PLANTATIONS : SURVEILLEZ-LES

TOUTES ESPECES : Communiqué VIVACOOP - Analyses foliaires
Petite mineuse, Tordeuse Orientale, Carpocapse - Poursuivez la protection
Maladies de conservation - Des risques dans les 3 semaines avant la récolte
CASSIS : Maintenez un bon état végétatif des plantations
MELON : Communiqué VIVACOOP - Contre la grille physiologique
VIGNE : Tordeuse de la grappe - Des dates pour les traitements 2ème génération
Cicadelle de la Flavescence Dorée - 2ème traitement sur les larves

ARBRES FRUITIERS

TOUTES ESPECES

COMMUNIQUE VIVACOOP : analyses foliaires

Elles permettent de contrôler l'alimentation du verger et d'adapter votre fertilisation.

Dates de prélèvement :

- pêcher : date de floraison + 105 jours)
- pommier : date de floraison + 75 jours) 1er - 15 Juillet
- kiwi : date de floraison + 90 jours : 1er Septembre

PERSONNES INTERESSEES: contactez le service technique

ACARIENS - Surveillez-les. Seuil : 70 % des feuilles occupées

Si une intervention est nécessaire, utilisez un acaricide adulticide et larvicide ou APOLLO, CESAR OU CROPOTEX associé à un adulticide-larvicide.

ABRICOTIER

Respectez les délais d'emploi avant récolte

PETITE MINEUSE (ANARSIA) - Protégez les vergers habituellement atteints

Le vol se poursuit. On utilisera un produit autorisé contre la Tordeuse Orientale.

MALADIES DE CONSERVATION - Fruits de plus en plus sensibles

Nous sommes dans la période critique. Protégez soigneusement la récolte, selon l'inoculum au verger et l'humidité (temps orageux, pluie, irrigation par aspersion).

P287

PECHER

Respectez les délais d'emploi avant récolte

TORDEUSE ORIENTALE - Une nette retombée du 2ème vol

Sur presque tous les postes, elle s'est amorcée dans les derniers jours de Juin. Des éclosions de chenilles plus nombreuses sont attendues dans les prochains jours. **Maintenez la protection selon les préconisations de notre dernier Bulletin.**

MALADIES DE CONSERVATION - Risques dans les 3 semaines avant la récolte

La remarque concernant l'abricotier vaut aussi pour le pêcher.

OIDIUM - Surveillez vos variétés sensibles

La protection sera maintenue si des symptômes ont été repérés (au printemps sur fruit, ou plus récemment sur pousses).

PRUNIER

CARPOCAPSE - Renouvellement de la protection

En verger régulièrement attaqué, intervenez dès réception. Ailleurs, on pourra reporter le renouvellement au 15-16 Juillet. En verger sensible, ajoutez un fongicide efficace contre la rouille.

PUCERON FARINEUX - Quelques attaques aussi sur pruniers

Rappelons que seuls les aphicides spécifiques sont en mesure de combattre ce puceron à multiplication très rapide.

POIRIER - POMMIER

CARPOCAPSE - Maintenez la protection selon la rémanence de votre produit

Le premier vol semble diminuer en région précoce, mais se poursuit de façon intensive en région semi-tardive (LUSSAS) et tardive (MEYRAS).

TAVELURES - En l'absence de taches, la protection peut être suspendue

La décision doit être reprise après observation minutieuse du verger. En présence de taches, poursuivez la protection préventive en fonction des risques de pluies contaminatrices et des irrigations par-dessus. Utilisez de préférence un produit de contact.

POMMIER

MINEUSE CERCLEE - Bientôt le début de la 2ème génération

Nous sommes en fin de nymphose. Seuls sont à protéger spécifiquement :

- les vergers dont la production est destinée à l'export vers l'Amérique du Nord
- ceux où l'attaque de Mineuse Cerclée est déjà importante.

Dans certains vergers déjà très atteints (GROSPIERRES, CHAMBONAS...), les futures attaques risquent d'aboutir à un dessèchement précoce de feuilles. Observez vos parcelles.

- les utilisateurs d'ovicide interviendront en milieu de semaine prochaine

Produits utilisables : TALSTAR, KLARTAN, DIMILIN, DART - DIMILIN et DART ne sont pas utilisables que si la récolte n'est pas exportée vers l'Amérique du Nord.

- les utilisateurs de larvicides attendront un prochain Bulletin.

OIDIUM - Poursuivez la protection jusqu'à l'arrêt de la pousse active

Après, il s'agira de limiter l'extension de la maladie dans les vergers atteints.

BITTER-PIT - Dans les plantations sensibles, pensez aux traitements préventifs